


「B型肝炎ワクチン」について



＜B型肝炎とは＞

- B型肝炎は、B型肝炎ウイルスの感染により起こる肝臓の病気です。
- B型肝炎ウイルスへの感染は、一過性の感染で終わる場合と、そのまま感染している状態が続いてしまう場合（この状態をキャリアといいます）があります。乳幼児が感染すると、ウイルスが体から排除されにくく、一部は将来、慢性肝炎、肝硬変や肝がんになるおそれがあります。
- ワクチンを接種することで、一過性の肝炎を予防できるだけでなく、キャリアになることも予防できます。ウイルスに対する抵抗力をつけるためには3回の接種が必要です。

＜接種方法等について＞

対象者	接種期間等について	接種料金	接種方法
1歳未満の人 （誕生日の前日まで） ※いずれも大崎市に住所を有する人が対象です。	接種期間 ：1歳未満 標準的な接種期間 ：生後2か月から9か月未満 接種スケジュール ：27日以上の間隔で2回、更に初回接種から139日以上（19週6日）を経過した後に1回を接種。（計3回） （例） 	無料	市内指定医療機関（裏面参照）へ直接予約して接種してください。 

＜接種後に起こるかもしれない体の変化（副反応）＞

- 接種箇所が赤くなったり、腫れたり、しこりができたり、痛みを感じたりすることがあります。
- 注射したところだけでなく、熱が出たり、刺激に反応しやすくなったりすることがあります。
- いつもより機嫌が悪かったり、ぐずったり、眠そうにしたりすることがあります。
- 極めてまれに、アナフィラキシー（急激なアレルギー反応により、じんましんがでたり呼吸が苦しくなったりすること）、急性散在性脳脊髄炎（免疫力が強すぎて自分自身の体を攻撃してしまうという現象で、起こる脳や脊髄の病気で、症状は、発熱・嘔吐・意識がはっきりしない・手足が動きにくいなど）などの重い病気にかかることがあると言われています。
 ※予防接種を受けた後、気になる症状や体調の変化があらわれたら、すぐに医師へ相談してください。

＜注意点＞

★母子感染予防のために、健康保険の給付によりワクチン投与を受けた人は、定期接種の対象外です。

★ラテックス過敏症の方は、医師にご相談ください。

※ラテックス過敏症とは、天然ゴムの製品に対する即時型の過敏症です。ラテックス製の手袋使用時にアレルギー反応がみられた場合、また、ラテックスと交差反応のある果物等（バナナ・栗・キウイフルーツ・アボガド・メロン等）にアレルギーがある場合に疑います。