

1歳を過ぎたら… 「麻しん・風しんワクチン」「水痘ワクチン」、 「おたふくかぜワクチン」の時期です

「麻しん」とは・・・

麻しんウイルスの空気感染・飛沫感染・接触感染によって起こり、発熱、せき、鼻汁、目やに、発疹が主症状です。最初の3～4日間は38度前後の熱で、一時おさまりかけたと思うと、また39～40度の高熱と発疹が出ます。感染力が強く、肺炎や脳炎等の合併症を起こすこともあります。



「風しん」とは・・・

風疹ウイルスの飛沫感染によって起こり、軽い風邪症状で始まり発疹、発熱、後頸部リンパ節腫脹などが主症状です。麻しん同様、合併症を起こすこともあります。妊娠早期にかかると先天性風疹症候群により心臓病、白内障、聴力障害等の障害を持った児が生まれる可能性が高くなります。

「水痘（みずぼうそう）」とは・・・


水痘帯状疱疹ウイルスの空気感染・飛沫感染・接触感染によって起こり、特徴的な発疹が主症状でかゆみを伴います。発熱を伴うこともあります。感染力が強いため乳幼児が集団生活を送っている保育園などでは流行しやすい病気です。合併症はまれですが経過は軽い人から重い人(重症の発疹や脳炎等の合併症)まであります。

「おたふくかぜワクチン」とは・・・

ムンプスウイルスの飛沫感染によって起こり、耳下腺部または顎下腺部の腫れが主症状です。合併症としてまれに髄膜炎や難聴を起こすことがあります。

「接種後に起こるかもしれない体の変化」

ワクチンの副反応の主なものには、赤くなったり腫れたりすることや、発熱や発疹があります。また、まれにアナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、けいれんなどの副反応が生じる可能性があります。予防接種を受けた後、気になる症状や体調の変化が現れたら、すぐに医師に相談してください。

	種類	対象者	接種回数	接種料金	接種方法
定期接種	麻しん・風しん混合 (MR)	1期 1～2歳未満 (誕生日の前日まで) 2期は小学校入学前の1年間	1期：1回  2期：1回 	無 料	市内指定医療機関に直接予約をして、接種してください。
	水痘	1～3歳未満 (誕生日の前日まで) ※既に水痘にかかった人は対象外です。	2回  標準的な接種間隔： 6か月～1年		
任意接種	おたふくかぜ	1～5歳未満 (誕生日の前日まで)	1回 	指定医療機関の接種料金から公費助成額 3,000円を引いた額	